

Fall 2: Ein älterer Herr mit einem großen Hämatom



Anamnese, Symptome:

Ein 75 Jahre alter Patient kommt zur Abklärung eines neu aufgetretenen Hämatoms am re. Oberschenkel. Das Hämatom ist spontan aufgetreten, kein Trauma erhebbar.

Vorerkrankungen: Hypertonie, Adipositas, chron. Vorhof-Flimmern, leichte Niereninsuffizienz

Blutungsanamnese:

| Art der Blutung | wann | Schweregrad | Blutungs-Behandlung |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Nasenbluten | Nein | | |
| Haut-Hämatome | Seit 4 Tagen | Re.Obersch., Durchmesser 12 cm | Xarelto pausiert |
| Nachblutung nach Verletzungen | Nein | | |
| Mundschleimhaut | Nein | | |
| Gastrointestinaltrakt | Nein | | |
| Hämaturie | Nein | | |
| Nach Zahnextraktionen | Nein | | |
| Nach Operationen | Nein | | |
| Starke Regelblutung | - | | |
| Postpartale Blutungen | - | | |
| Muskelblutungen | Nein | | |
| Gelenksblutungen | Nein | | |
| Intrazerebrale Blutungen | Nein | | |
| Andere Blutungen | Nein | | |

Siehe auch: ISTH-Bleeding Assessment Tool (<https://bleedingscore.certe.nl/>)

Familienanamnese: unbekannt

Klinischer Status: guter AZ, 12 cm Hämatom am re. Oberschenkel, dunkelblau; geringe Hämatome bd. Hände

Medikamente/Indikation: Acemin, Concor, Jardiance, Xarelto (seit 2 Tagen pausiert wegen Hämatom)

Laborwerte:

| Parameter | Ergebnis | | Normalbereich |
|--------------------------------|------------|----------|---------------|
| Prothrombinzeit (%) | 65 | | 80-140 |
| APTT (Sek.) | 87 | H | 27-41 |
| Thrombinzeit (Sek.) | 17 | | <21 |
| Anti-Xa (U/mL) | 0,2 | | <0,1 |
| Fibrinogen (g/dL) | 3,4 | | 2,0-4,0 |
| PFA 100 Epi (Sek.) | - | | 82-150 |
| PFA 100 ADP (Sek.) | - | | 62-100 |
| Von Willebrand Faktor: Ag (%) | 260 | H | 60-180 |
| Von Willebrand Faktor: Akt (%) | - | | 48-170 |
| Faktor II:Akt. (%) | - | | 75-130 |
| Faktor V:Akt. (%) | - | | 75-130 |
| Faktor VII:Akt. (%) | - | | 75-160 |
| Faktor VIII:Akt. (%) | 3 | L | 60-230 |
| Faktor IX:Akt. (%) | 87 | | 60-140 |
| Faktor X:Akt. (%) | - | | 70-150 |
| Faktor XI:Akt. (%) | 93 | | 60-140 |
| Faktor XII:Akt. (%) | 78 | | 60-140 |
| Faktor XIII:Akt. (%) | - | | 70-140 |
| Tauschversuch | pos | | neg |
| Thrombozyten (G/L) | - | | 150-350 |
| Blutgruppe | unbekannt | | |

Auflösung:

Erworbene Hämophilie A